

Casus Progressieve Afasie (PPA), een handvat voor het borgen van zinnige en zuinige zorg

Dieuwke-Petra Kluiwstra. logopedist, spraak-/taalpatholoog

Tot 1 oktober 2021: Omring, Advies- en behandelcentrum

Vanaf 1 oktober 2021: Wilgaerden-Leekerweide-Groep, ebc360



Introductie

- ✓ Vanuit kennis, ervaring en intuïtie krijgt een patiënt vaak al goede logopedische zorg
- ✓ Doelmatig handelen kan versterkt worden door Methodisch Logopedisch Handelen
- ✓ De daardoor efficiëntere (zuinige) en effectievere (zinnige) logopedische zorg wordt geïllustreerd d.m.v. een casus
- ✓ Deelnemers voelen zich veilig genoeg om zelf op hun handelen te reflecteren
- ✓ Door deze casus hebben deelnemers een handvat om methodisch te handelen volgens de kwaliteitstoets
- ✓ Na enkele PPA-patiënten zullen zij minder behandelingen nodig hebben en hoger scoren op klanttevredenheid, logopedisten hebben meer vertrouwen in hun eigen handelen en het gewenste therapie-effect bij het behandelen van progressieve afasie.
- ✓ De volgende recente ontwikkelingen in de (logopedische) zorg worden daarbij meegenomen: gedeelde besluitvorming (samen beslissen / shared decision making), het positieve gezondheid-principe (zie <https://www.iph.nl>), differentiaal diagnostiek bij PPA (o.a. CCS, spraakpraxie), nieuw voorlichtingsmateriaal (educatie-kaarten dementie) en digitaal oefenmateriaal (digitaal, logoclicks).



Methode

- Casestudy N = 1. Casus van 59-jarige man met een PPA door een Fronto Temporale Dementie
- De figuur geeft naast een algemeen handvat voor het borgen van zinnige en zuinige zorg een concreet voorbeeld van een patiënt met progressieve afasie
- Het tellen van het aantal en de duur van de behandelingen geeft inzicht in de kosten




Conclusie

- 1) Weinig behandelingen nodig: 8 behandelingen van 45 minuten: kosten ca €480.
- 2) Meer zelfvertrouwen bij logopedist: VAS van 7 naar 8
- 3) Hoge tevredenheid van mantelzorger: VAS van 7 naar 8



Implicaties

- Onderzocht kan worden of het gebruik hiervan na één jaar zorgt voor een lagere behandelindex en een grotere klanttevredenheid
- Deze methode zou in de toekomst bij een eventuele zorginfarct door de dubbele vergrijzing en de schaarste van logopedisten kunnen bijdragen aan de behandeling van een grotere groep afasiepatiënten binnen dezelfde behandel tijd.
- Deze methode is gebaseerd op een n=1 studie, vervolg onderzoek zou zich kunnen richten op een grotere en heterogene groep patiënten die behandeld worden door logopedisten vanuit zowel de vrije vestiging als in dienst van een zorginstelling.



Resultaat

